

CALENDÁRIO VACINAL CRIANÇA 0-10 anos

Inativadas

Hepatite A: Protege contra hepatite do tipo A. Indicada a partir de 12 meses de vida, esquema de doses: duas doses com intervalo de 06 meses entre elas.

Hepatite B: Protege contra hepatite do tipo B. Três ou quatro doses, dependendo da vacina utilizada. O esquema de dose inicia no nascimento.

Hexavalente Acelular: protege contra difteria, tétano, coqueluche acelular, haemophilus influenzae, poliomielite e Hepatite B. As doses acontecem aos 02,04, 06 meses de vida e possuem um reforço aos 15 meses de vida.

HPV Nonavalente: protege contra 9 tipos de Papiloma Vírus Humano que podem causar cânceres do colo de útero, de vulva, de ânus, de vagina, de pênis e orofaringe. Além de infecções persistentes e verrugas genitais de meninas e mulheres, meninos e homens. indicadas para ambos sexos na faixa etária de 09 a 14 anos, com o esquema de 02 doses com intervalo de 06 meses entre elas.

****A vacina HPV quadrivalente será descontinuada em dez/2023 na rede privada****

Influenza: Protege contra influenza e o esquema vacinal pode ser iniciado aos 06 meses de vida. Sendo que para crianças não vacinadas menores de 09 anos de idade (08 anos 11 meses e 29 dias) o esquema de doses será duas doses com intervalo de 30 dias entre elas. Para imunocomprometidos e idosos, dependendo do risco epidemiológico recomenda-se uma segunda dose após três meses da primeira dose.

Meningite Meningocócica ACWY: protege contra meningite meningocócica A,C,W e Y. As doses podem ser iniciadas aos 03 meses de vida, sendo que se iniciado nesta faixa etária, terá uma dose aos 05 meses e um reforço aos 12 meses. Entretanto pode mudar de acordo com a faixa etária.

Meningite Meningocócica B: protege contra meningite meningocócica B. As doses podem ser iniciadas aos 03 meses de vida, sendo que se iniciado nesta faixa etária, terá uma dose aos 05

meses e um reforço aos 12 meses. Entretanto pode mudar de acordo com a faixa etária.

Pneumocócica 13: protege contra 13 tipos de pneumococo que causam pneumonia, também confere proteção contra otite, sinusite bacteriana, rinite bacteriana, meningite causada pelo pneumococo. A vacina pode ser iniciada aos 02 meses de vida. Mas o esquema vacinal pode variar de acordo com a faixa etária.

Atenuadas

Rotavírus Pentavalente: protegem contra 05 tipos de rotavírus que causam gastroenterites graves. As doses acontecem aos 02, 04, 06 meses de vida. A primeira dose precisa ser administrada com até 03 meses e 15 dias.

BCG: Protege contra tuberculose. Vacina aplicada ao nascer, para bebês com peso superior a 2kg.

Febre Amarela: protege contra febre amarela e o esquema vacinal é realizado aos 9 meses e reforço aos 04 anos.

Tríplice Viral: Protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Duas doses. O esquema de dose acontece aos 12 meses e 15 meses.

Varicela: Protege contra catapora. Duas doses. O esquema de dose acontece a partir dos 12 meses de vida e pode ser antecipado o reforço que ocorre aos 04 anos de vida. Habitualmente na rede privada, o esquema ocorre aos 12 meses e 15 meses.

Dengue: Protege contra os quatro tipos de vírus que causam a dengue e pode ser iniciada aos 04 anos de vida. Esquema de duas com intervalos de 90 dias entre elas.

Esquema cronológico da primovacinação:

IDADE	VACINA
Ao nascer vacina BCG e Hepatite B	
2 meses	Hexavalente
	Rotavírus
	Pneumocócica 13
3 meses	Meningocócica B

	Meningocócica ACWY
4 meses	Pentavalente/Hexavalente Rotavírus Pneumocócica 13
5 meses	Meningocócica B Meningocócica ACWY
6 meses	Hexavalente Rotavírus Pneumocócica 13 Gripe
7 Meses	Gripe
9 meses	Febre Amarela
12 meses	Meningocócica B Meningocócica ACWY Tríplice Viral Varicela Hepatite A
15 meses	Pentavalente Pneumocócica 13 Tríplice Viral Varicela
18 meses	Hepatite A

IDADE	VACINA
02 anos	Gripe
03 anos	Gripe
04 anos	DTPa+Polio Febre Amarela Gripe Dengue
5 anos	Gripe
6 anos	Meningocócica ACWY (reforço recomendado após 5 anos da última dose) Gripe
7 anos	Gripe
8 anos	Gripe

09 anos	Gripe
	DTPa
	HPV
9 anos e 06 meses	HPV
<ul style="list-style-type: none">• O calendário vacinal não dispensa avaliação de esquemas já realizados pois a necessidade de reforços depende da faixa etária da criança e data de realização da vacina pretendida.	
<ul style="list-style-type: none">• Pacientes que já imunizaram pela rede pública podem se beneficiar das vacinas disponíveis na rede privada para complementar a sua caderneta vacinal	

Fonte : Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)