

VACINAÇÃO DE PESSOAS COM CARDIOPATIA E/OU PNEUMOPATIA CRÔNICAS

Inativadas:

Influenza: Recomendada para todos indivíduos a partir dos 06 meses de vida, dentro da disponibilidade preferir à Vacina quadrivalente à vacina trivalente, em idosos e imunossuprimidos dependente do risco epidemiológico, pode ser considerado uma segunda dose após 03 meses da dose anual.

Vacina Pneumocócica 13: indicada a partir dos 02 meses de vida, o esquema vacinal depende da faixa etária, para maiores de 02 anos e adultos não vacinados um dose confere proteção para toda vida.

Vacina Pneumocócica 23: A partir dos 2 anos de idade: duas doses com intervalo de cinco anos entre elas. Se a segunda dose de VPP23 foi aplicada antes de 60 anos de idade, uma terceira dose está recomendada após essa idade, com intervalo mínimo de cinco anos da última dose.

Hepatite B: Recomendar de acordo com os calendários SBlm para cada faixa etária. Nos casos de hepatopatia grave com imunocomprometimento, hepatopatia terminal ou transplante hepático – quatro doses: 0 - 1 - 2 - 6 meses, com o dobro da dose recomendada para a faixa etária. Nesses casos, recomenda-se a realização de sorologia 30 a 60 dias após o término do esquema. Considera-se imunizado se Anti HBs = ou >10 mUI/mL. Se Anti HBs.

Tríplice Bacteriana (DTPw ou DTPa) Ou Tríplice Bacteriana do Tipo Adulto (dTpa): o esquema de dose visa de acordo com a faixa etária e preferível o uso da tríplice bacteriana acelular, visto ser reatogênica.

Herpes Zoster: Recomendada a partir de 50 anos: duas doses (0 - 2 meses). Recomendada

para pacientes que já tiveram a doença e para vacinados previamente com a vacina atenuada, respeitando um intervalo mínimo de dois meses entre elas.

Fonte: Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIIm)