

VACINAÇÃO DE PESSOAS COM DOENÇA RENAL CRÔNICA

Inativadas

Influenza: Recomendada para todos indivíduos a partir dos 06 meses de vida, dentro da disponibilidade preferir à Vacina quadrivalente à vacina trivalente, em idosos e imunossuprimidos dependente do risco epidemiológico, pode ser considerado uma segunda dose após 03 meses da dose anual.

Vacina Pneumocócica 13: indicada a partir dos 02 meses de vida, o esquema vacinal depende da faixa etária, para maiores de 02 anos e adultos não vacinados um dose confere proteção para toda vida.

Vacina Pneumocócica 23: A partir dos 2 anos de idade: duas doses com intervalo de cinco anos entre elas. Se a segunda dose de VPP23 foi aplicada antes de 60 anos de idade, uma terceira dose está recomendada após essa idade, com intervalo mínimo de cinco anos da última dose.

Meningite Meningocócica ACWY: sempre que possível, fazer uso da vacina meningocócica conjugada, para adultos não vacinados, uma dose

Meningocócica B: Crianças e adolescentes: recomendar de acordo com os calendários SBIIm para cada faixa etária. • Adultos até 50 anos: se há hepatopatia grave com imunocomprometimento.

Hepatite A: Recomendar de acordo com os calendários SBIIm para cada faixa etária.

Hepatite B: Quatro doses: 0 - 1 - 2 - 6 meses, com o dobro do volume recomendado para a faixa etária. Necessário solicitar a sorologia para hepatite B um a dois meses após a última dose do esquema. Considera-se imunizado se Anti HBs = ou >10 mUI/mL. Se sorologia negativa, repetir o esquema vacinal de quatro doses, uma única vez. Em caso de hemodiálise:

repetir sorologia anualmente; se Anti HBs

Fonte: Sociedade Brasileira Imunizações (SBIIm)

 (35) 99853-9970

 (35) 3421-9915

 imunoclinicvacinas.com.br

 @imunoclinicvacinas