

VACINAÇÃO DE PESSOAS COM ERROS INATOS DA IMUNIDADE (IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA)

Influenza Recomendada para todos indivíduos a partir dos 06 meses de vida, dentro da disponibilidade preferir à Vacina quadrivalente à vacina trivalente, em idosos e imunossuprimidos dependente do risco epidemiológico, pode ser considerado uma segunda dose após 03 meses da dose anual.

Vacina Pneumocócica 13, indicada a partir dos 02 meses de vida, o esquema vacinal depende da faixa etária, para maiores de 02 anos e adultos não vacinados um dose confere proteção para toda vida.

Vacina Pneumocócica 23: A partir dos 2 anos de idade: duas doses com intervalo de cinco anos entre elas. Se a segunda dose de VPP23 foi aplicada antes de 60 anos de idade, uma terceira dose está recomendada após essa idade, com intervalo mínimo de cinco anos da última dose.

Meningite Meningocócica ACWY: • Sempre que possível, usar a vacina meningocócica conjugada ACWY. Para crianças com mais de 1 ano, adolescentes e adultos nunca vacinados: duas doses com intervalo de dois meses. Após primovacinação: uma dose de reforço a cada cinco anos.

Meningocócica B: Crianças e adolescentes: Recomendar de acordo com os calendários SBIm para cada faixa etária. Adultos até 50 anos: duas doses com intervalo de um a dois meses entre elas. Acima desta faixa etária o uso é *off label*. Nos casos de deficiência do complemento, recomenda-se uma dose de reforço um ano após o fim do esquema de doses básico para cada faixa etária. Além disso, revacinar a cada dois ou três anos.

Hepatite A Recomendar de acordo com os calendários SBIm para cada faixa etária.

Hepatite B: Para imunocompetentes, três doses: 0 - 1 - 6 meses

Para imunodeprimidos, quatro doses: 0 - 1 - 2 - 6 meses, com o dobro do volume recomendado para a faixa etária.

Necessário solicitar a sorologia para hepatite B um a dois meses após a última dose do esquema. Considera-se imunizado se Anti HBs = ou >10 mUI/mL. Se sorologia negativa, repetir o esquema vacinal de quatro doses, uma única vez. Em caso de hemodiálise: repetir sorologia anualmente; se Anti HBs.

Haemophilus influenzae b: Para menores de 5 anos: ver Calendário de vacinação SBIm criança. Para crianças maiores de 1 ano, adolescentes e adultos não vacinados: duas doses com intervalo de dois meses entre elas. Para anteriormente vacinados, mas que não receberam dose de reforço após os 12 meses de idade: uma dose.

HPV: Três doses: 0 - 1 a 2 - 6 meses. Esquema de três doses é obrigatório para imunossuprimidos, mesmo entre 9 e 14 anos.

Herpes zoster inativada (VZR): Para maiores de 18 anos: duas doses com intervalo de dois meses (0-2 meses).

A vacinação está recomendada mesmo para aqueles que já desenvolveram a doença. Intervalo entre quadro de HZ e vacinação: seis meses ou após resolução do quadro, considerando a perda de oportunidade vacinal.

Poliomielite Inativada: Recomendar de acordo com o Calendário de vacinação SBIm criança.

Para maiores de 1 ano não vacinados: três doses com intervalo de dois meses entre elas (mínimo de 30 dias).

Inativadas

Varicela: Se paciente não imunocomprometido – Recomendar de acordo com os calendários SBIm para cada faixa etária.

Fonte: Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)